

## *Limenitis populi* (L.) dans les Alpes Ligures (Lep. Nymphalidae)

Arnaldo BORDONI

Museo Zoologico «La Specola», via Romana 17, Firenze.

Au cours d'une de mes chasses aux Zygènes, mon fils Enrico m'a fait remarquer un grand papillon qui se posait sur les branches à presque 3 m au-dessus du sol. Après de nombreux essais pour le faire se rapprocher, je pus enfin capturer ... une femelle de *Limenitis populi* (L.) en parfait état. On sait que ce Nymphalide eurasiatique, commun dans certaines parties de l'Europe, présente en Italie une distribution exclusivement alpine. Très localisé, il est connu de stations sporadiques du Trentin, du Haut-Adige (Merano, Val Genova, Pinzolo, Lago di Garda, Valle Isarco, Val Sugana) et du Piémont. Dans cette dernière province, l'espèce est signalée (du N au S) seulement de Vanzone (Valle Anzasca), Alagna (Valle Sesia, Novara), Ivrea, Val di Susa : Meana, Ulzio, Colletto, Chiomonte jusqu'au Monte Frais, Bussoleno (Torino) (VERITY, 1950) ; Val di Cogne (Aosta) (TEOBALDELLI, 1979) ; S. Lorenzo di Valdieri en Val Gesso (Cuneo) (BALDIZZONE, 1966). Sur le versant français, il est cité de S. Martino Lantosca, Alpes Maritimes (VERITY, l.c.).

La station la plus méridionale de cette espèce en Italie est le Monte Monega (Imperia) dans les Alpes Ligures, où l'on a pris 1 ♂ dans la forêt domaniale de Rezzo, à 1650 m. (BALLETO & TOSO, 1975).

J'ai capturé mon exemplaire le 1.VII.1983 aux environs de Calizzano (Savona), à la lisière d'un bois de châtaigniers, sur la route pour le Colle del Melogno, un peu plus loin que le village, situé à 650 m d'altitude, dans la vallée de la rivière Bormida di Millesimo, au-dessous de la ligne de partage des eaux, sur le versant septentrional, entre la Bocchetta di Altare (350 m.), (à l'extrémité septentrionale des Apennins, dont Calizzano n'est pas très éloigné à vol d'oiseau) et le Colle di S. Bernardo (950 m.).

Ce village, bien qu'il soit très frais et riche en forêts de châtaigniers et de hêtres, n'est pas une localité alpine, et n'est pas non plus situé à l'entrée d'une vallée alpine, comme Vanzone ou S. Lorenzo di Valdieri. Tout au plus peut-on parler de zone préalpine. De toute façon, il s'agit là de la station de *Limenitis populi* (L.) la plus orientale des Alpes Ligures et la plus

voisine de l'extrémité occidentale de la chaîne alpine italienne, soit au début des Apennins septentrionaux.




Fig. 1. Carte de répartition de *Limenitis populi* (L.) en Italie : Stations connues (cercles) ; nouvelle station (triangle).

### Références bibliographiques

- BALDIZZONE, G., 1966. Ritrovamento di *Limenitis populi* L. nelle Alpi Maritime (Lep. Rhopalocera). *Boll. Soc. ent. it.*, XCVI, 9-10 : 144.
- BALLETTO, E. & TOSO, G. G., 1975. Reperti di Ropaloceri nelle Alpi Liguri. *Boll. Soc. ent. it.*, 107, 9-10 : 160-163.
- TEOBALDELLI, A., 1979. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste. *Alexanor*, XI, 3 : 98-104.
- VERITY, R., 1950. Le Farfalle Diurne d'Italia, Marzocco, Firenze, vol. IV : 57.